

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014


## 1. Obecné informace

### a) Meteorologická situace

#### 3-denní předpověď

	ÚT	ST	ČT
<b>Břeclav</b>	30 °C	30 °C	25 °C
<b>Brno</b>	28 °C	30 °C	25 °C
<b>Hodonín</b>	30 °C	31 °C	26 °C
<b>Uherské Hradiště</b>	29 °C	32 °C	23 °C
<b>Znojmo</b>	28 °C	28 °C	25 °C

#### Týdenní předpověď pro ČR



#### Předpověď počasí

##### úterý

Jasno nebo skoro jasno, večer ojediněle bouřky. Nejnižší noční teploty 17 až 13 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 °C.

##### středa

Skoro jasno až polojasno. Během dne v Čechách od západu postupně přibývá oblačnost s bouřkami a přeháňkami. Ojediněle intenzivní bouřky s přívalovými srážkami s úhrny kolem 50 mm, kroupami a nárazy větru kolem 25 m/s. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 30 až 35 °C, v západní polovině Čech kolem 28 °C.

##### čtvrtek

Oblačno až zataženo, na většině území občasné deště nebo přeháňky, místy bouřky, zejména na východě území. Nejnižší noční teploty 18 až 14 °C. Nejvyšší denní teploty 23 až 27 °C, na jihovýchodě až 30 °C.

##### pátek

Oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky. Nejnižší noční teploty 15 až 11 °C. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 °C, na jihovýchodě až 26 °C.

##### sobota až neděle

Převážně oblačno, místy přeháňky. Nejnižší noční teploty 13 až 8 °C. Nejvyšší denní teploty 19 až 24 °C.

Zdroj: [www.yr.no](http://www.yr.no), [www.chmi.cz](http://www.chmi.cz)

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY




Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

## b) Fenofáze révy



<b>65</b>	<b>plné kvetení, 50 % čepiček opadlo</b>
<b>69</b>	<b>konec kvetení</b>

V tomto období, podle lokalit a odrůd, nastanou fáze 65–69 BBCH.

## c) Vhodnost podmínek pro vývoj sledovaných chorob a škůdců pro aktuální týden

<b>CHOROBY</b>	<b>Předpokládaná vhodnost podmínek</b>	
Plíseň révy	● ●	<b>slabá, střední</b> (v první polovině období budou nepříznivé podmínky pro patogen, příznivé podmínky budou pouze na lokalitách s vydatnými srážkami ve druhé polovině období).
Padlí révy	● ●	<b>silná, střední</b> (po převážnou část období budou příznivé podmínky pro patogen, méně příznivé podmínky budou na lokalitách s vydatnějšími dešťovými srážkami ve druhé polovině období a v závěru období, kdy dojde k mírnému ochlazení)
Botrytiová hniloba květenství	●	<b>slabá</b> (na lokalitách s vydatnějšími dešťovými srážkami ve druhé polovině období)
<b>ŠKŮDCI</b>	<b>Předpokládané riziko výskytu</b>	
Obaleči	○	<b>žádné</b>

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

## 2. Doporučení

### a) Choroby

#### Plíseň révy



#### Zhodnocení situace v minulém období

V průběhu minulého období byly méně příznivé podmínky pro patogen. Pokud byly v průběhu první poloviny minulého období splněny srážkové podmínky pro primární infekce, byly infekce limitovány nízkými nočními teplotami. Druhá polovina období byla pro patogen nepříznivá.

#### Aktuální vývoj choroby

Od počátku zralosti oospor může docházet při splnění podmínek (vydatný déšť, min. 10 mm srážek za 24 hod., průměrná denní teplota neklesne pod 10(13) °C a minimální

teplota pod 8 °C) k primárním infekcím.

Předpokladem primárních infekcí jsou dešťové srážky, které zajistí nezbytné zvlhčení a klíčení oospor a přesun zoospor na vnímavé části keřů a vhodná teplota.

K dalším primárním infekcím, případně k sekundárnímu šíření (tam, kde budou výskyty choroby), může dojít při vydatných lokálních dešťových srážkách pouze v průběhu druhé poloviny období.

Sledujte nadále první výskyty choroby (inkubační doba při teplotách 14 °C: 10 dnů, 18 °C: 6 dnů, 22–26 °C: 3,5–4 dny).

#### Stanovení potřeby ošetřování

Zahájení ošetřování by mělo být usměrněno podle některé z metod krátkodobé prognózy (Galati Vitis, SHMÚ Bratislava) s přihlédnutím k opakovanému splnění podmínek pro primární infekce, případně při zjištění prvních primárních výskytů choroby.

**Pokud je využívána pro usměrnění ochrany metoda krátkodobé prognózy a signalizace ošetření SHMÚ Bratislava (dle Šteberly), sledují se od 1. května srážky a kumulativní úhrn srážek se vynese k 15. květnu jako první údaj do prognostického grafu. Další hodnoty se vynášejí do grafu pravidelně po týdnu a celková hodnota představuje sumu týdenních úhrnů dešťových srážek od počátku května.**

**Ošetřuje se, pokud křivka sumy týdenních úhrnů srážek dosáhne oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) nebo při zjištění prvního výskytu choroby.**

**V současné době se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje na většině lokalit v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu. Pokud se v období před květem pohybuje křivka v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu po dobu 2 týdnů, je signalizováno ošetření před květem a další dvě ošetření po odkvětu v intervalu 10–14 dní.**

**Kritická hodnota sumy týdenních úhrnů srážek ke dni 11.6. pro dosažení oblasti sporadicko-kalamitního výskytu (nad křivkou B) je 66 mm a pro dosažení oblasti kalamitního výskytu (nad křivkou A) je 94 mm (od 1.5.).**

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

V první části minulého období byly na některých lokalitách splněny srážkové podmínky pro primární infekce, infekce byly limitovány nízkými nočními teplotami. V první polovině tohoto období budou podle předpovědi nevhodné podmínky pro primární infekce, resp. šíření patogenu. K dalším infekcím může dojít jen na lokalitách s vydatnějšími dešťovými srážkami ve druhé polovině období.

**Ošetřování by mělo být zahájeno podle některé z metod krátkodobé prognózy (podle SHMÚ Bratislava, pokud se křivka sumy týdenních úhrnů srážek pohybuje v období před počátkem kvetení 2 týdny v oblasti sporadicko-kalamitního výskytu nebo se dostane do oblasti kalamitního výskytu) nebo po minimálně dvakrát splněných podmínkách primární infekce, případně při zjištění prvního výskytu. První dvě podmínky jsou na většině lokalit splněny.**

Z kontaktně a preventivně působících fungicidů je vhodný především přípravek Folpan 80 WG, který zpevňuje pletiva a zvyšují odolnost proti padlí, omezuje výskyt botrytiové hniloby květenství a neomezuje populace dravého roztoče *T. pyri*.

Optimální je porosty ošetřit preventivně před dalším splněním podmínek primární infekce. Při rozhodování o potřebě ošetření je třeba vždy přihlídnout k aktuální předpovědi počasí.

Na počátku tohoto období by mělo být dokončeno první, obligátní ošetření v období krátce před květem, případně na počátku kvetení. Toto ošetření má předejít, pokud dojde ke změně počasí v průběhu kvetení šíření choroby a především zabránit napadení velmi citlivých květenství. Další obligátní ošetření se doporučuje provést krátce po odkvětu.

Integrovaná produkce	Poznámka
Kontaktně a preventivně působící fungicidy: (Antre 70 WG, typ Dithane, Folpan 80 WG, Polyram WG, Manfil 75/80 WG, Novozir MN 80 New)	Pro preventivní ošetření je vhodné upřednostnit kontaktně a preventivně působící fungicid.
kombinované přípravky s obsahem úč.l. fosetyl-AI Alliette Bordeaux, Cassiopee 79 WG, Profiler	Tam, kde budou vhodnější podmínky pro šíření choroby, je vhodné použít v období před květem kombinované přípravky, nejlépe s obsahem úč.l. fosetyl-AI
Ostatní fungicidy Acrobat MZ WG, Areva Combi, Cabrio Top, typ Curzate, Electis, Emendo M, Forum Star, Forum Gold, Mildicut, Pegaso, Pergado F, Quadris Max, Tanos 50 WG, Valis M, Vincare,	Použít je možné i ostatní, převážně kombinované, fungicidní přípravky proti plísni révy (Strobiluriny jen v kombinacích s účinnou látkou s odlišným působením, pokud nebyla na lokalit zaznamenána snížená citlivost patogenu)
Ekologická produkce	Poznámka
Alginure, Cu fungicid	

### Padlí révy



#### Zhodnocení situace v minulém období

V letošním roce byl předpoklad početnějších primárních výskytů, a pokud nastanou vhodné podmínky pro patogen je předpoklad časnějšího výskytu choroby.

Primární výskyty představují napadené letorosty, které vyrostly z oček, v nichž patogen přezimoval. Předpokladem početných primárních výskytů je časný a silnější výskyt choroby v předchozím roce a dobré přezimování patogenu (propagule patogenu v očkách ničí teploty pod  $-15^{\circ}\text{C}$ ). V loňském roce byly ve vztahu k fenofázím révy relativně časně a lokálně i silné výskyty padlí, takže mohlo dojít k početným infekcím spodních oček, která zůstávají po řezu na tažnících a teploty v průběhu zimy neklesly pod  $-15^{\circ}\text{C}$ . V závěru minulého období byly velmi příznivé podmínky pro patogen.

#### Aktuální vývoj choroby

V první polovině období budou pokračovat příznivé podmínky pro patogen. Ve druhé polovině období dojde podle předpovědi ke srážkám přeháňkového a bouřkového charakteru a budou relativně méně vhodné podmínky pro šíření patogenu.

#### Stanovení potřeby ošetřování

V průběhu před předminulého období bylo doporučeno provést první ošetření rizikových porostů (především porosty náchylných odrůd s významným výskytem choroby v loňském roce).

**V průběhu tohoto období je třeba dokončit druhé ošetření významně ohrožených porostů a dokončit první ošetření ostatních ohrožených porostů. Vzhledem k tomu, že v průběhu příznivého před předminulého období došlo k sekundárnímu šíření choroby a v závěru minulého období nastaly velmi příznivé podmínky pro patogen, je třeba k ošetření významně ohrožených porostů použít intenzivnější fungicid a zkrátit interval mezi ošetřeními (7, max. 10 dnů).**

Optimální podmínky pro šíření patogenu, kdy je třeba zajistit intenzivní ošetřování porostů, představují minimálně 3 dny za sebou s teplotami po dobu 6 hodin v rozmezí  $21-30^{\circ}\text{C}$ .

Ošetření přípravky na bázi elementární síry provádět při teplotách nad  $16^{\circ}\text{C}$ , optimálně nad  $18^{\circ}\text{C}$ .

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

Integrovaná produkce	Poznámka
Kontaktně a preventivně působící fungicidy <b>Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 WG)</b> <b>Domark 10 EW, Punch 10 EC, Talent, Topas 100 EC</b>	Pro ošetření méně ohrožených porostů před květem je možno upřednostnit kontaktně a preventivně působící fungicidy na bázi síry  nebo triazoly
<b>Collis, Dynali, Falcon 460 EC, Impulse Super, Prosper, Rombus Trio, Vivando,</b>	U velmi rizikových porostů je třeba pro ošetření před květem použít intenzivněji působící přípravky
<b>Cabrio Top, Discus, Quadris, Quadris Max, Zato 50 WG</b>	Použit je možné i samotné strobiluriny (pokud není předpoklad snížené citlivosti patogenu, strobiluriny je třeba striktně střídat s fungicidy s odlišným působením)
Ekologická produkce	Poznámka
<b>Kumulus WG, Sulfurus, Sulfolac 80 WG, AquaVitrin K</b>	

## Botrytiová hniloba květenství



### Zhodnocení situace v minulých obdobích

V průběhu minulého období byly méně příznivé až nepříznivé podmínky pro patogen *Botrytis cinerea*.

### Aktuální vývoj choroby

Ve druhé polovině období budou dle předpovědi lokálně vydatnější dešťové srážky, na těchto lokalitách může dojít k napadení květenství náchylných odrůd.

### Stanovení potřeby ošetřování

Tam kde budou vydatnější srážky, je vhodné použít v době dokvétání

odrůd s hustým hroznem (optimálně 80 % odkvetlých květů) přípravek se současnou nebo vedlejší účinností proti patogenu *Botrytis cinerea* (folpet nebo kombinace s folpetem, strobiluriny).

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

## b) Živočišní škůdci

### Vlnovník révový



#### Aktuální výskyt:

Na více lokalitách trvají významnější výskyty škůdce. Při silnějším napadení jsou poškozena i květenství.

#### Předpoklad dalšího šíření.

Sledujte nadále výskyty poškození.

Doporučujeme označit ohniska silného napadení k ošetření na počátku rašení v příštím roce.

#### Stanovení potřeby ochrany:

Porosty s opakovaným silnějším výskytem měly být ošetřeny v období počátku rašení polysulfidem vápníku (registrovaná listová hnojiva s vedlejší akaricidní účinností, Síra SK 520, Sulka new, Sulka Extra).

Ošetření specifickými akaricidy v průběhu

vegetace není dostatečně účinné. U silně napadených porostů doporučujeme provést vyhodnocení výskytu dravého roztoče *T.pyri*.

### Hálčivec révový



#### Aktuální výskyt:

Na některých lokalitách trvají významnější výskyty škůdce.

#### Stanovení potřeby ochrany:

Intenzivní růst révy omezuje škodlivost škůdce. Sledujte nadále výskyty a v případě silnějšího výskytu je třeba provést ošetření na počátku přechodu přezimujících samiček do zimních úkrytů (zpravidla druhá polovina srpna).

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

## Nově povolené přípravky k ochraně révy

### **Cuprozin Progress** (hydroxid měďnatý 383,8 g/l, formulace SC)

Měďnatý fungicid (a baktericid) nové generace. Speciální úprava účinné látky a formulace přípravku zajišťují vysokou biologickou účinnost při použití nízké dávky mědi. Jde zejména o optimální tvar a velikost krystalů účinné látky, což zajistí lepší pokrytí a postupné rovnoměrné a déle trvající uvolňování Cu iontů. Aplikováno je pouze 20 % mědi v porovnání s dávkou 4 kg /ha nejčastěji používanou u klasických měďnatých fungicidů obsahujících 50 % mědi. Významně šetří životní prostředí.

Přípravek je určen k ochraně révy proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 0,8 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l/ha (min. koncentrace 0,16 %) a od fáze BBCH 61 v dávce 1,6 l/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l/ha (min. koncentrace 0,16 %). Při plné dávce 400 g mědi /ha. Přípravek Cuprozin progress je nejvhodnější použít obdobně jako ostatní měďnaté fungicidy pro závěrečná ošetření proti plísni révy, kdy zajistí dobrou ochranu plně vyvinutých, především starších listů. Přípravek je velmi vhodný pro použití v IP a EZ, kde jsou stanoveny limity použití mědi.

Ochranná lhůta (OL) 21 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: Spiess-Urania Chemicals GmbH, Hamburg, Německo.

### **Moximate 725 WG** (mankozeb 680 g/kg, cymoxanil 45 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, cymoxanil náleží do skupiny kyanoacetimid oximů, mankozeb do skupiny dithiokarbamátů. Cymoxanil je specificky účinný na oomycety. Působí kontaktně a lokálně systémově, účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně. V rostlinných pletivech je rychle metabolizován, má krátké reziduální působení. Zásadně je používán v kombinaci s kontaktními fungicidy, které prodlužují dobu působení. Doba účinnosti je dána dobou působení kontaktní složky přípravku. Působí specificky, je ohrožen rezistencí. Riziko vzniku rezistence je střední. Mankozeb je široce působící fungicidní účinná látka. Používán je především proti oomycetám a původcům listových skvrnitostí. Působí kontaktně a účinkuje preventivně. Omezuje dravého roztoče *Typhlodromus pyri*, populace Mikulov. Přípravky obsahující mankozeb včetně kombinací je možno v IP použít max. 2x v průběhu vegetace. Přípravek Moximate 725 WG je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 1,25 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l/ha (min. koncentrace 0,25 %) a od fáze BBCH 61 v dávce 2,5 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l/ha (min. koncentrace 0,25 %). Max. počet aplikací 6x v průběhu vegetace (stanoveno na základě toxikologických a ekotoxikologických studií, ne ve vztahu k riziku vzniku rezistence).

Ochranná lhůta (OL) 28 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: Indofil Industries Limited, Milan, Itálie

### **Collis** (boskalid 200 g/l + kresoxim-methyl 100 g/l, formulace SC)

Kombinovaný fungicidní přípravek, boskalid náleží do skupiny karboxamidů, podle působení k inhibitorům sukcinát dehydrogenázy (SDHI fungicidy) a kresoxim-methyl do skupiny QoI fungicidů, podskupiny strobiluriny. Boskalid má široké spektrum účinnosti. Působí kontaktně a systémově, účinkuje především preventivně. Zabraňuje klíčení spor a inhibuje růst mycelia, má významnou antisporulační účinnost. Působí specificky (jednobodově) v procesu dýchání, cílovým místem je enzym sukcinát dehydrogenáza. Cross – rezistence v rámci SDHI fungicidů – boskalid Collis, Cantus, fluopyram Luna Prestige. Riziko vzniku rezistence je střední až vysoké. Přípravky ze skupiny SDHI je možno použít maximálně 3x v průběhu



# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

vegetace proti oběma chorobám révy (padlí révy - Collis, šedá hniloba hroznů révy - Cantus, Luna Prestige a ne více než pro 50 % celkového počtu aplikací. Kresoxim-methyl náleží do skupiny QoI fungicidů. Má velmi široké spektrum účinnosti. Působí kontaktně a hloubkově a vykazuje preventivní a krátkodobou kurativní účinnost. Část účinné látky je ukládána do voskového povlaku rostlinných částí, odkud je následně uvolňována (mezostemické působení) Působí specificky (jednobodově), narušují proces dýchání. Účinkují v quinnovém vazebním místě cytochromálního komplexu bc1. Riziko vzniku rezistence je vysoké. Cross-rezistence v rámci QoI fungicidů, další účinné látky azoxystrobin (Quadris, Quadris Max), pyraclostrobin (Cabrio Top) a trifloxystrobin (Zato 50 WG).

Přípravek Collis je určen k ochraně révy proti padlí révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 0,3 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l/ha (min. koncentrace 0,06 %) a od fáze BBCH 61 (počátek kvetení) v dávce 0,6 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l/ha (min. koncentrace 0,06 %). Collis je vhodný především pro použití v období silného ohrožení porostů a pro situace, kdy se využije jeho vedlejší účinnost na šedou hnilobu hroznů.

Maximální počet použití v průběhu vegetace 3x a maximálně 50 % celkového počtu použití přípravků ze skupiny SDHI proti padlí révy a šedé hnilobě hroznů révy.

Ochranná lhůta (OL) 28 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: BASF SE Ludwischafen, Německo

Právní zástupce v ČR: BASF, spol. s r. o. Praha, ČR

## **Cantus** (boskalid 500 g/kg, formulace DG)

Boskalid náleží do skupiny inhibitorů karboxamidů, podle působení k inhibitorům sukcinát dehydrogenázy (SDHI fungicidy). Má široké spektrum účinnosti. V révě je používán proti padlí révy a šedé hnilobě hroznů révy. Působí kontaktně a systémově, účinkuje především preventivně. Zabraňuje klíčení spor, inhibuje růst mycelia a má významnou antisporulační účinnost. Působí specificky (jednobodově) v procesu dýchání, cílovým místem je enzym sukcinát dehydrogenáza. Cross – rezistence v rámci SDHI fungicidů - boskalid Cantus, Collis; fluopyram Luna Prestige. Riziko vzniku rezistence je střední až vysoké. Přípravky ze skupiny SDHI je možno použít v průběhu vegetace maximálně 3x proti oběma chorobám (padlí révy – Collis, šedá hniloba hroznů révy – Cantus, Luna Prestige) a ne více než na 50 % celkového počtu aplikací.

Přípravek Cantus je povolen k ochraně révy proti šedé hnilobě hroznů révy v dávce 1,2 kg/ha. Je vhodný především pro základní ošetření proti šedé hnilobě hroznů révy v období počátku zrání hroznů (zaměkání).

Ochranná lhůta (OL) 28 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci BASF SE Ludwigshafen Německo

Právní zástupce v ČR: BASF, spol. s r. o. Praha, ČR

## **Areva Combi** (dimethomorf 113 g/kg + folpet 600 g/kg, formulace WG)

Kombinovaný fungicidní přípravek, dimethomorf náleží do skupiny amidů kyseliny karboxylové (CAA fungicidy), folpet do skupiny ftalimidů. Dimethomorf je specificky účinný proti oomycetám. Působí kontaktně a systémově, účinkuje preventivně a krátkodobě kurativně, působí antisporulačně. V buňce působí specificky (jednobodově), inhibuje syntézu fosfolipidů a jejich ukládání do buněčných stěn. Riziko vzniku rezistence je střední. Cross-rezistence v rámci CAA fungicidů - další přípravky na bázi dimethomorfu (Acrobat MZ WG, Forum Gold, Forum Star), iprovalikarb (Cassiopee 79 WG, Melody Combi 65,3 WG), benthialikarb (Vincare), mandipropamid (Pergado F), valifenalát (Emendo M, Valis M,

# ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ČINITELŮ A DOPORUČENÍ K OCHRANĚ RÉVY



Zpráva č.: 6

Týden: 24

Období: 9.6.2014 – 15.6.2014

Pegaso F). Přípravky ze skupiny CAA fungicidů mohou být použity max. 4x nebo maximálně pro 50 % celkového počtu ošetření v průběhu vegetace (v IP max. 3x). Folpet působí kontaktně a účinkuje preventivně. Je účinný proti oomycetám (plíseň révy) původcům listových skvrnitostí (červená spála révy) a hnilobám (šedá a bílá hniloba hroznů révy). Zpevňuje pletiva a omezuje výskyty padlí. Neovlivňuje výskyt dravého roztoče *T.pyri* (populace Mikulov). Není ohrožen rezistencí (vícebodové působení).

Přípravek Areva Combi je určen k ochraně proti plísni révy. Do fáze BBCH 61 (počátek kvetení) se používá v dávce 1 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 500 l /ha (min. koncentrace 0,2 %), a od fáze BBCH 61 v dávce 2 kg/ha, dávka aplikační kapaliny max. 1000 l vody/ha (min. koncentrace 0,2 %). Přípravek Areva Combi je doporučen především pro preventivní ošetření v období významného ohrožení porostů. Optimální je použití v období, kdy se využije jeho vedlejší účinnost na šedou hnilobu (dokvétání, zapojování hroznů). Maximální počet ošetření 3x během vegetace, po 2 ošetřeních přerušit sled použitím fungicidu s odlišným působením. Přípravek je určen jen k ošetření moštových hroznů.

Ochranná lhůta (OL) 28 dní.

Držitel rozhodnutí o registraci: Agrovita s.r.o.

Právní zástupce v ČR: Agrovita s.r.o., Jesenice, ČR

Podrobnější informace o uvedených škodlivých organismech, jejich popisy a případně vyobrazení nebo údaje o doporučených přípravcích je možné získat na internetových stránkách:

Ekovín - Svaz integrované a ekologické produkce hroznů a vína, o.s.

<http://www.ekovin.cz>

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

<http://www.ukzuz.cz>

Galati

<http://www.galati.sk/galati>